

# 休みたくても休めない 酷使した目の疲れにこの一滴!

# ロートV11

13mL

## ◆製品特徴

第2類医薬品

- ① 11種の有効成分がづらい目の疲れ・かゆみ・充血を効果的に改善します。
- ② 4種の栄養成分、3種の抗炎症成分をバランス良く配合。酷使した目のことを考えた処方設計です。
- ③ 目が疲れてリフレッシュしたいときにもうれしい清涼感のある爽やかなさし心地です。

## ◆容器特徴

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる  
フリーアングルノズル®



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式スクリュウキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

## 使用上の注意 ⚠

### 相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人: はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人: 緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 5~6日間使用しても症状がよくなる場合

## 用法・用量

1回1~2滴、1日5~6回点眼してください。

### 用法・用量に関連する注意

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたりかえって充血を招くことがありますので用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用のみ使用してください。



容器の先と目やまつ毛がふれることのないように

成分		
有効成分	配合量	はたらき
塩酸テトラヒドロソリン	0.05%	血管を収縮させて目の充血を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03%	ヒスタミンをブロックして目のかゆみを抑えます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	ピント調節機能を回復して目の疲れを改善します。
ビタミンB6	0.1%	新陳代謝を促進して目の疲れを改善します。
酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール (天然型ビタミンE)	0.05%	血行を促進して目の疲れを改善します。
L-アスパラギン酸カリウム	1%	細胞呼吸を促進して目の疲れを改善します。
アミノエチルスルホン酸	0.5%	新陳代謝を促進して目の疲れを改善します。
アラントイン	0.1%	起こってしまった炎症症状(かゆみ・充血など)を鎮めます。
硫酸亜鉛水和物	0.05%	紫外線などによる目の炎症を鎮めます。
グリチルリチン酸二カルシウム	0.1%	炎症の原因となる物質の放出を抑え、かゆみ・充血を抑えます。
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	0.1%	角膜表面を保護して目の疲れを改善します。


※添加物として、ホウ酸、ホウ砂、 $\beta$ -メントール、d $\beta$ -カンフル、エデト酸Na、ポリソルベート80、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クロロブタノール、ベンザルコニウム塩化物、pH調節剤を含有します。

### 効能・効果

- 目の疲れ
- 結膜充血
- 目のかすみ(目やにの多いときなど)
- 目のかゆみ
- 眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)
- 眼瞼炎(まぶたのただれ)
- 紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)
- ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

### 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40℃以上)に放置しないでください。
- (2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5) 他の人と共用しないでください。
- (6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。  
なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとってご使用ください。
- (8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。



### お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間9:00~18:00(土、日、祝日を除く)